



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Lenka Kroniková.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

Test – intramuskulární aplikace léků

(zakroužkujte správnou odpověď)

Jméno a příjmení.....

Datum.....

1. Musculus gluteus maximus je:

- a) sval deltový
- b) čtyřhlavý sval stehenní
- c) střední hýžďový sval
- d) velký hýžďový sval

2. Intramuskulární injekce se nejčastěji aplikují do oblasti:

- a) musculus gluteus maximus
- b) musculus gluteus medius
- c) musculus minimus
- d) musculus deltoideus

3. Intramuskulární injekce je:

- a) vpravení účinného léku do podkoží
- b) vpravení účinného léku do žíly
- c) vpravení účinného léku hluboko do svalu
- d) vpravení účinného léku do kůže pod epidermis

4. Intramuskulární injekce u malých dětí se nejčastěji aplikují do oblasti:

- a) musculus quadriceps femoris
- b) musculus gluteus minimus
- c) musculus gluteus medius
- d) musculus gluteus maximus

5. Hepatotoxické účinky znamenají:

- a) poškození ledvin
- b) porucha krvetvorby
- c) porucha funkce vestibulárního ústrojí
- d) poškození jater

6. Pokud se lék při intramuskulární aplikaci nedostane do svalu:

- a) nic se neděje, účinek léku je stejný
- b) lék se opouzdří a vzniká absces
- c) objeví se v místě aplikace hematom
- d) vzniká mikroembolizace

7. K ředění antibiotik se používá:

- a) 5% glukóza
- b) 10% glukóza
- c) 20% glukóza
- d) 40% glukóza

8. Zkratka intramuskulární injekce je:

- a) i.d.
- b) s.c.
- c) i.m.
- d) i.v.

-----Klíč-----

1. (d)
2. (b)
3. (c)
4. (a)
5. (d)
6. (b)
7. (a)
8. (c)