



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Králová Radka.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

PRACOVNÍ LIST – Fyziologie cévní soustavy

1. Doplně:

Tělní tekutina u hlístic, která vyplňuje prostor mezi střevem a svalovinou a jejíž oběh je zajištěn pohybem svaloviny, se nazývá.....

2. Tělní tekutinou u houbovců je

- a) hydrolymfa
- b) hemolymfa
- c) nemají pravou tělní tekutinu

3. Doplně:

Jednotná tělní tekutina u živočichů s otevřenou cévní soustavou se nazývá.....a obsahuje.....a.....

Oddělené tělní tekutiny mají živočichové scévní soustavou, mezi které patří například.....

4. Tkáňový mok vzniká

- a) filtrací mízy
- b) filtrací krve
- c) zahuštěním lymfy

5. U hmyzu je cévní soustava

- a) uzavřená
- b) otevřená
- c) srdce je uloženo na břišní straně těla

6. Hemoglobin je obsažen

- a) v hemolymfě čmeláka
- b) v hemolymfě žížaly a erytrocytech hmyzu
- c) v erytrocytech králíka a hemolymfě žížaly
- d) v erytrocytech holuba a hydrolymfě žahavců

7. Spoj, co k sobě patří:

A- srdce složené z 1 síně a jedné komory

B- srdce složené ze 2 síní a 1 komory

C- srdce složené ze 2 síní a 2 komor s neúplnou přepážkou

D- srdce složené ze 2 síní a 2 zcela oddělených komor

E- trubicovité srdce

1- výr velký

2- užovka obojková

3- mlok skvrnitý

4- úhoř říční

5- žížala obecná