

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍČINY:

1. úrazové:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

2. neúrazové:

- I. _____
- II. _____
- III. _____
- IV. _____

DRUHY KRVÁCENÍ:**VNĚJŠÍ**

1. krev uniká do tělní dutiny, orgánů, tkání
2. _____
-

VNITŘNÍ

- I. _____
- _____

TEPENNÉ

- 1) _____
-
- 2) vystřikuje z rány, ev. pulzuje v rytmu srdce
- 3) _____

ŽILNÍ

- krev tmavě červená
- _____
-

VLÁSEČNICOVÉ

1. drobná poranění, oděrky

SMÍŠENÉ


- ⌚ _____
-
- ⌚ při poruše tepen dojde vždy k poranění žil i kapilár

INTENZITA:**500 ml****1000 ml****2000 ml a více**

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OŠETŘENÍ TEPENNÉHO KRVÁCENÍ

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**ZAŠKRCOVADLO
KDY POUŽÍT?**

1. pokud dojde k prosáknutí i třetí tlakové vrstvy
2. pokud dojde k úrazové amputaci
3. pokud je v silně krvácející ráně cizí těleso
4. pokud je přítomna otevřená zlomenina s masivním krvácením
5. pokud je rána velmi rozsáhlá
6. pokud je hodně zraněných a málo zachránců

1. šířka škrtidla alespoň 5 cm (nikdy provázky, tkaničky, dráty...)
2. nikdy nepřikládat na holou kůži
3. nikdy přes kost (těsně pod loket, koleno), možnost poškození nervů
4. přiložit co nejbližší ráně, mezi ránu a srdce
5. zvednout končetinu nad úroveň srdce (umožní odtok žilní krve, doplní krevní oběh)
6. po přiložení zaškrcovadla sterilní krytí rány
7. zapíšeme čas přiložení škrtidla
8. nejdéle každou hodinu na 2-3 min. povolujeme
9. končetinu znehybnit, popř. chladit (zmírnění bolesti, zpomalení metabolismu buněk)


OŠETŘENÍ ŽILNÍHO KRVÁCENÍ

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

OŠETŘENÍ KAPILÁRNÍHO KRVÁCENÍ

1. _____
2. _____
3. _____

Nakresli, jak vypadá tzv. mašlička:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KRVÁCENÍ DO DUTINY LEBEČNÍ

PŘÍZNAKY

- viditelné poranění na hlavě
- úder do hlavy
- porucha, ev. ztráta vědomí
- u zlomenin spodiny lebeční výtok z nosu, uší (směs krve a mozkomíšního moku)
- dezorientace
- zmatenost

PP

- zajištění základních životních funkce a průchodnosti dýchacích cest
- uložení do stabilizované polohy
- využít terénní nerovnosti (hlava výše než nohy)
- u zlomeniny spodiny lebeční položit raněného na tu stranu, kde mu krvácí ucho
- kontrola základních životních funkcí
- přivolání ZZS

Nakresli polohu při lebečním krvácení:

KRVÁCENÍ DO DUTINY HRUDNÍ

PŘÍZNAKY

- a) tupý úder do oblasti hrudníku (např. volant)
- b) obtíže při dýchání (mělké a povrchní)
- c) dušnost
- d) neklid
- e) rozvoj šokového stavu
- f) pozor na možný rozvoj zavřeného pneumothoraxu

PP

1. _____
2. _____
3. _____

Nakresli polohu při krvácení do dutiny hrudní:

KRVÁCENÍ DO DUTINY BŘÍŠNÍ

PŘÍZNAKY

- _____
- _____
- _____

PP

1. raněného uložit na záda, končetiny podložené v kolenou (paty se nedotýkají země)
2. kontrola základních životních funkcí
3. přivolání ZZS

Nakresli polohu při krvácení do dutiny břišní:

KRVÁCENÍ DO DUTINY BŘIŠNÍ

PŘÍZNAKY

1. _____
2. _____
3. _____

PP

1. záleží na intenzitě krvácení
2. genitál překrýt sterilním krytím
3. uložit do polohy na záda, podložit nohy a pánev
4. kontrola základních životních funkcí
5. přivolat ZZS, ev. u slabších krvácení zajistit lékařské ošetření